

SIEW

Pszenżyto zaleca się wysiewać w terminie 15.IX. – 30.IX. Obsada 300 roślin na m². Norma wysiewu na naj-słabszych kompleksach glebowych, przy wadliwej agrotechnice lub opóźnionym siewie powinna być podwyż-szona o 20%, natomiast przy bardzo wczesnym siewie obniżona o 20%. Do wysiewu należy używać zaprawio-nego kwalifikowanego materiału siewnego.

PIELĘGNACJA

Łan pszenżyta spełnia podstawowe warunki dobrej konkurencyjności wobec chwastów dzięki szerokim li-ściom, sztywnej słomie, wysokim roślinom i dużej zwartości łanu. W warunkach małego zachwaszczenia oraz poprawnego następstwa roślin odstępuje się od ingerencji chemicznej. Jednak bardzo często można się spotkać ze specjalizacją gatunkową chwastów objawiającą się występowaniem w pszenżycie m.in. miotły zbożowej, przytuli czepnej czy bratka trójbarwnego, które w dużym natężeniu szkodliwie oddziałują na łan.


- Zaleca się zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych jesienią. W przypadku nie wykonania zabiegu niszczenia chwastów jesienią zabiegi te należy wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji.
- W przypadku stanowiska po zbożach (z wyjątkiem owsa) w razie potrzeby wykonać zabieg zwalczania cho-rób podstawy źdźbła w fazie od 1-2 kolanka.
- Przy intensywnej uprawie należy zastosować antywyłegacz.
- Przy uprawie na stanowisku po kukurydzy należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie plantacji przed porażeniem fuzariozami, zwłaszcza w latach wilgotnych.

ZBIÓR

Przeprowadzać zaraz po osiągnięciu pełnej dojrzałości. Nie przetrzymywać dojrzałego zboża na polu.



Technologia ochrony pszenżyta ozimego



Tworzymy **postęp**
w rolnictwie.

**Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR**

Strzelce
woj. łódzkie
99-307 Strzelce
ul. Główna 20
tel. 24 356-69-00
fax. 24 356-69-02


Dział handlowy:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

Oddział Borowo
woj. wielkopolskie
64-020 Czempin
tel. 61 282-72-67,
fax. 61 282-62-97
borowo@hr-strzelce.pl

Oddział Małyszyn
woj. lubuskie
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 81
tel. 95 722-85-20
fax. 95 720-39-68
malyszyn@hr-strzelce.pl

Oddział Kończewice
woj. kujawsko-pomorskie
87-140 Chełmża
tel. 56 675-92-97
fax. 56 675-92-27
konczewice@hr-strzelce.pl

Przedstawiciele regionalni:



www.hr-strzelce.pl

Pszenżyto ozime

Meloman

Plon, jak z nut



**Najczęściej zalecana do uprawy
odmiana pszenżyta ozimego w Polsce!**



Tworzymy **postęp**
w rolnictwie.

**Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR**

Meloman
Plon, jak z nut




Bardzo
dobra zimotrwałość
5,5/9

Wysoka
odporność
na porastanie
ziarna w kłosie
6/9
ex aequo w
Polsce!


Najczęściej zalecana do uprawy
odmiana pszenżyta ozimego w Polsce!

Wysokie plony na terenie całego kraju




Plonowanie (% wzorca) odmiany
MELOMAN w doświadczeniach
PDO 2017 (poziom a1)

Doskonałe plony także po mroźnych zimach




Plonowanie (% wzorca) odmiany
MELOMAN w doświadczeniach PDO
po mroźnej zimie w 2016 (poziom a1)

Bardzo wysoka tolerancja
na zakwaszenie gleby



Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++
(im wyższa wartość tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby)
- wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2014.

Doskonałe i wiernie plonujący



Plonowanie (%) odmiany MELOMAN w porównaniu do wzorca w
doświadczeniach COBORU (rejestracje oraz PDO) w latach 2013-2017.

Ważniejsze cechy rolnicze

	wczesny	średni	późny
Termin kłoszenia			
Termin dojrzewania			

	niska	średnia	wysoka
Mrozoodporność			
Tolerancja na zakwaszenie gleby			
Odporność na wyłeganie			
Wysokość			
MTZ			
Zawartość białka			

Odporność na choroby	niska	średnia	wysoka
Pleśń sniegowa			
Mączniak prawdziwy			
Rdza żółta			
Rdza brunatna			
Rynchosporioza			
Septorioza liści			
Septorioza plew			
Fuzarioza kłosów			
Choroby podstawy źdźbła			

INFORMACJE AGROTECHNICZNE

WYMAGANIA GLEBOWE

Pszenvyto można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Dobrym przedplonem są: rzepak ozimy, strączkowe i motylkowe, wczesne ziemniaki, mieszanki zbożowo-strączkowe. Mniej korzystnym przedplonem są zboża z wyjątkiem owsa.

NAWOŻENIE

- azotem: do 100 kg N/ha, ale można zmniejszyć o ok. 20 kg bez szkody na plonie w przypadku:
 - uprawy po bardzo dobrym przedplonie
 - regularnej gospodarki obornikowej w płodozmianie
 - przyorania niesłomistej masy organicznej.
- po przedplonach niezbożowych lepiej nie stosować przedsięwzięcia azotu, wtedy pszenżyto wykorzysta zmineralizowany azot glebowy. Natomiast po przedplonach zbożowych można zastosować np. w polifosce około 20 kg azotu. Na wiosnę w okresie ruszania wegetacji należy zastosować około 60 kg azotu w czystym składniku, a drugą część dawki w okresie strzelania źdźbła. Jeśli planujemy otrzymać bardzo wysoki plon, to całkowita dawka azotu może wynieść około 140 kg w czystym składniku.
- fosforem: do 80 kg P₂O₅, w przypadku niedoborów tego składnika w glebie należy dodać tzw. różnice bilansowe, które wynoszą 40-60 kg/ha P₂O₅, jednak nie więcej niż 115 kg/ha czystego składnika.
- potasem: do 120 K₂O, w przypadku niedoborów potasu naddatki bilansowe wynoszą 30-40 kg/ha K₂O, nie więcej niż 145 kg czystego składnika na hektar. Zarówno fosfor jak i potas można stosować w nawozach pojedynczych, mieszanych i kompleksowych. Jednak niezależnie od formy nawozu, należy go zastosować przedsięwzięcie, gdyż aplikowanie pogłównie nie wpływa korzystnie na ich efektywność.